


Triángulo de inyección



Extension
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

Bill Halfman, Beef Outreach Specialist
Extension Educators Sandy Stuttgen, Carolyn Ihde, and Adam Hartfiel



Triángulo de inyección

A: delante del punto del hombro

B: por encima de las vértebras

C: debajo del ligamento nucal

- Aguja de 3/4 a 1 pulgada para inyección intramuscular
- Aguja de 1/2 a 3/4 pulgada para inyección subcutánea

- Seleccione productos de baja dosificación
- Siga las instrucciones de la etiqueta, incluidos los tiempos de retiro de los medicamentos
- Se prefieren los productos subcutáneos (SQ) a los intramusculares (IM)
- 10 cc o menos por sitio de inyección intramuscular
- Separe las inyecciones múltiples por 4 pulgadas (lo ancho de la mano) entre sí
- Cuando administre dos productos en el mismo lado del cuello, coloque la inyección intramuscular por encima de la subcutánea
- Puede ser necesario inyectar en ambos lados del cuello



Cita: Beef Quality Assurance National Manual. 2019 Cattlemen's Beef Board and National Cattlemen's Beef Association

© 2025 Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin.

La División de Extensión de la Universidad de Wisconsin-Madison ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y la programación, de conformidad con las leyes estatales y federales..